

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ТАУФОН™
капли глазные

Торговое название: Тауфон™

Международное непатентованное название – таурин

Лекарственная форма: капли глазные 4 %.

Состав: активное вещество: таурин - 40 мг/мл; вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Описание: Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа – Препараты для лечения патологии глаз.

Код АТС. S01XA

Фармакологическое действие

Таурин является серосодержащей аминокислотой. Стимулирует репаративные и регенерационные процессы при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Препарат способствует нормализации функций клеточных мембран, активации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления ионов калия и кальция и улучшению условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению

Тауфон применяют у взрослых в качестве стимулятора репаративных и регенераторных процессов при дистрофиях роговицы, старческих диабетических, травматических и лучевых катарактах, первичной открытоугольной глаукоме в сочетании с β -адреноблокаторами (для улучшения оттока водянстой влаги), а также как средство стимуляции восстановительных процессов при травмах роговицы.

Способ применения и дозы

При катарактах Тауфон применяют в виде инстилляций по 1–2 капли 2 – 4 раза в день, ежедневно в течение 3 месяцев. Курсы повторяют с месячным интервалом. При травмах и дистрофических поражениях роговицы применяют в тех же дозах в течение месяца. При открытоугольной глаукоме инстилируют в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2 раза в день за 20 – 30 мин до закапывания β -адреноблокатора (тимолола) в течение 6 недель, с последующим перерывом на 2 недели.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет, беременность и период кормления грудью.

Передозировка

При передозировке промыть глаза теплой водой.

Особые указания

Препарат содержит консервант бензалкония хлорид, который может абсорбироваться контактными линзами. Перед закапыванием препарата линзы следует снять и установить обратно не ранее, чем через 15-20 мин после инстилляции препарата.

Бензалкония хлорид также может вызывать раздражение глаз, особенно при наличии сухости глаз или заболеваний роговицы (прозрачный слой в передней части глаза).

Если после применения препарата отмечаются нарушение зрения, жжение или боль в глазу, следует обратиться к врачу.

При применении препарата нельзя прикасаться кончиком пипетки к какой-либо поверхности во избежание попадания бактерий внутрь флакона.

Влияние на способность водить и использовать машины

Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, сразу после закапывания препарата не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим оборудованием, требующим четкости зрения.

Применение в период беременности и кормления грудью

Адекватных и контролируемых исследований по безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период кормления грудью не проводилось.

Применение в педиатрии

Нет достоверных данных об эффективности и безопасности применения препарата у детей.

Лекарственное взаимодействие

При сочетании с тимололом значительно усиливает гипотензивный эффект за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянстой влаги.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия содержимое флакона использовать в течение месяца.

Форма выпуска

Флаконы-капельницы из полиэтилена по 10 мл.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту.

Производитель



ЗАО «Ликвор», Армения
Ереван, Кочиняна 7/9
Тел: 37460 37 88 00
E-mail: info@liqvor.com
www.liqvor.com